

BIJSLUITER

BIJSLUITER

Dettol Med Chloorxylenol 48 mg/g, concentraat voor oplossing voor cutaan gebruik

Chloorxylenol

Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u.

Dit geneesmiddel kan zonder voorschrift verkregen worden. Desondanks moet u Dettol Med Chloorxylenol 48 mg/g zorgvuldig gebruiken om een goed resultaat te bereiken.

- Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen.
- Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
- Raadpleeg een arts, als uw verschijnselen verergeren of niet verbeteren na 14 dagen.
- Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

In deze bijsluiter:

1. Wat is Dettol Med Chloorxylenol 48 mg/g en waarvoor wordt het gebruikt
2. Wat u moet weten voordat u Dettol Med Chloorxylenol 48 mg/g gebruikt
3. Hoe wordt Dettol Med Chloorxylenol 48 mg/g gebruikt
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Dettol Med Chloorxylenol 48 mg/g
6. Aanvullende informatie

1. WAT IS DETTOL MED CHLOORXYLENOL 48 MG/G EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT

Dettol Med Chloorxylenol 48 mg/g geeft na verdunnen met water een melkachtige oplossing. De verdunde oplossing wordt gebruikt voor antiseptische reiniging van snijwonden, beten, schaafwonden en insectenbeten.

Dettol Med Chloorxylenol 48 mg/g is een geconcentreerde oplossing en dient te worden verdund vóór gebruik.

2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U DETTOL MED CHLOORXYLENOL 48 MG/G GEBRUIKT

Gebruik Dettol Med Chloorxylenol 48 mg/g niet

- als u eczeem heeft
- als u allergisch (overgevoelig) bent voor Chloorxylenol of een van de andere bestanddelen van Dettol Med Chloorxylenol 48 mg/g

Niet gebruiken rond de ogen, oren, neus of mond.

Wees extra voorzichtig met Dettol Med Chloorxylenol 48 mg/g

Bij inslikken de mond spoelen en veel water of melk drinken.

Bij contact met de ogen, de ogen goed spoelen met koud water.

In beide gevallen wordt aanbevolen om een arts te raadplegen.

Indien de oplossing onverdund wordt gebruikt, moet u de huid goed wassen en een arts raadplegen wanneer huidreacties optreden.

Gebruik met andere geneesmiddelen

Er zijn geen specifieke studies uitgevoerd. Het is daarom niet aanbevolen Dettol Med Chloorxylenol 48 mg/g gelijktijdig met andere uitwendige geneesmiddelen te gebruiken.

Zwangerschap en borstvoeding

Gebruik dit product niet als u zwanger bent of borstvoeding geeft.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Dettol Med Chloorxylenol 48 mg/g heeft geen invloed op rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen.

3. HOE WORDT DETTOL MED CHLOORXYLENOL 48 MG/G GEBRUIKT

Dit geneesmiddel is bestemd voor uitwendig gebruik.

Wonden, beten, schrammen en insectenbeten: Verdun 50 ml Dettol Med Chloorxylenol 48 mg/g met water tot 1 liter (1:20) en was de zone met deze verdunde oplossing. Afdekken met droog gaas of met watten opgevuld verband.

Dettol Med Chloorxylenol 48 mg/g kan worden gebruikt bij volwassenen en kinderen vanaf 12 maanden.

Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals alle geneesmiddelen kan Dettol Med Chloorxylenol 48 mg/g bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

Bijwerkingen zijn zeer zelden (minder dan 1 op 10.000 personen). Huidreacties kunnen optreden zoals irritatie, huiduitslag, afsterving van de huid, kloven op plaats van aanbrengen, ontsteking, huidontkleuring, jeuk, huidafschilfering en een brandend gevoel. Haarverlies werd ook gerapporteerd.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

5 HOE BEWAART U DETTOL MED CHLOORXYLENOL 48 MG/G

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Gebruik Dettol Med Chloorxylenol 48 mg/g niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op het etiket na 'EXP'. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.

Dit geneesmiddel vereist geen speciale bewaarcondities. De oplossing dient direct na verdunning te worden gebruikt.

Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

6. AANVULLENDE INFORMATIE

Wat bevat Dettol Med Chloorxylenol 48 mg/g

- Het werkzame bestanddeel is Chloorxylenol 48 mg/g
- De andere bestanddelen zijn: dennenolie, isopropylalcohol, ricinusolie, karamel (E150(c)) en zuiver water.

Hoe ziet Dettol Med Chloorxylenol 48 mg/g er uit en wat is de inhoud van de verpakking

Dettol Med Chloorxylenol 48 mg/g is een helder, geelbruine concentraat voor oplossing voor cutaan gebruik. De verdunde oplossing heeft een melkachtig witte kleur. Het wordt verpakt in flacons van 125, 250, 500, 750, 1000 en 1250 ml. Niet alle genoemde verpakkingsgroottes worden in de handel gebracht.

Dettol Med Chloorxylenol 48 mg/g is ingeschreven onder RVG 34838

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen:

Reckitt Benckiser Healthcare B.V., Siriusdreef 14, 2132 WT Hoofddorp, Nederland

Fabrikant:

Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Ltd, Dansom Lane, Hull, HU8 7DS, East Yorkshire, Groot-Brittannië

RB NL Brands B.V., Schiphol Boulevard 207, 1118 BH Schiphol, Nederland

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in februari 2019